



Fiberact®: psyllium loiro* para apoiar o trânsito intestinal



Uma atividade comprovada para facilitar a **evacuação das fezes** e promover a **evacuação de bolas de pelo**



Efeitos rápidos e visíveis em menos de **4 dias** para **mais de 90% dos cães e gatos**⁶



Produto de fácil administração para **70% dos tutores de gatos** e **82% dos tutores de cães**⁶

*Pó de casca de psyllium loiro (*Plantago ovata*)



Fiberact®: para apoiar o trato intestinal

Psyllium loiro* rico em fibras solúveis não fermentáveis que regulam o trânsito intestinal

O psyllium loiro* pode absorver até 40 vezes o seu peso em água¹

Fibras solúveis que:

atraem a água, dissolvendo-se numa substância semelhante a um gel, que não é absorvida durante a digestão, o que permite aos animais:



Regular os movimentos intestinais no intestino delgado e grosso. O aumento do volume fecal estimula o peristaltismo².



Facilitar a passagem das fezes.

A diminuição da pressão intraluminal aumenta as contrações do cólon e a frequência das defecações².

Indicado em caso de trânsito intestinal lento em gatos³

Estudo: 2 subgrupos de gatos com dificuldades em defecar (15 gatos e 51 gatos) receberam uma dieta enriquecida com psyllium durante um período de 2 meses


Resultado: um benefício clínico na maioria dos gatos (93% e 82%) e uma diminuição significativa ($p < 0,001$) da retenção de fezes foi observada nos 2 subgrupos



Reduzir as bolas de pelo.

Ajuda no controlo dos tricobezoares nos gatos⁴.

Número de sinais clínicos associados a bolas de pelo após 14 dias de suplementação⁴



- Estudo com 24 gatos com bolas de pelo: 12 gatos receberam uma dieta contendo psyllium - *ulmus rubra* (Olmo-eskorregadio) e 12 gatos receberam uma dieta placebo durante um período de 2 semanas
- Observou-se uma diminuição estatisticamente significativa dos sinais clínicos no grupo do psyllium - *ulmus rubra* (Olmo-eskorregadio), em comparação com o grupo placebo ($p < 0,05$)



A dieta contendo psyllium permitiu uma redução significativa dos sinais dos tricobezoares⁴

devido à sua **capacidade de atrair água, beneficiam os casos de fezes moles**⁵ e melhoram a consistência das fezes

*Pó de casca de psyllium loiro (*Plantago ovata*)

1. EMA, J. Wiesner et B. Merz, Assessment report on *Plantago ovata* Forssk., seminis tegumentum, European medicines agency, EMA/HMPC/199775/2012, London, 2013a.

2. Madgulkar A et al. Characterization of psyllium (*Plantago ovata*) polysaccharide and its uses. Polysaccharides. 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03751-6_49-1.

3. Freiche V et al. Uncontrolled study assessing the impact of a psyllium-enriched extruded dry diet on faecal consistency in cats with constipation. J Feline Med Surg. 2011 Dec;13(12):903-11.

4. Dann JR et al. A potential nutritional prophylactic for the reduction of feline hairball symptoms. J Nutr. 2004;134(8):2124S-2125S.

5. Alves JC et al. The use of soluble fibre for the management of chronic idiopathic large bowel diarrhoea in police working dogs. BMC Vet Res. 2021;17:100.

6. Muller S et al. Efficacy of organic blond psyllium husk powder to improve digestive transit and stool consistency: a pet-owners survey. 17th International veterinary Congress, Roma, Italy, 2022, August 1-2.

Estudo
2022

Fiberact® reduz os sinais associados a dificuldades na evacuação em cães e gatos⁶

Materiais e métodos



Pontuação fecal de 4 ou 5/5


(forma claramente definida com fissuras visíveis ou fezes duras, secas e fragmentadas, difíceis de evacuar)

**Fiberact® (2 g por 10 kg de peso corporal)
uma vez ao dia durante 7 dias**

Resultados

- Resposta visível em menos de 4 dias em mais de 90% dos animais.
- Redução estatisticamente significativa dos sinais de trânsito lento ($p < 0,05$).
- Fácil administração para 70% dos tutores de gatos e 82% dos tutores de cães.

Evolução dos sinais clínicos em cães e gatos com trânsito lento após a suplementação oral de psyllium



Quando recomendar Fiberact® ?

- Apoiar o trânsito intestinal em casos de trânsito lento (dieta pobre em fibras, stress, obesidade, falta de exercício, transtorno das glândulas anais...) ou fezes duras.
- Ajudar a reduzir as bolas de pelo, ou limitar a formação de bolas de pelo durante a muda em gatos.
- Contribuir para melhorar a consistência das fezes quando estas estão soltas.



Porquê recomendar Fiberact® ?



Uma atividade comprovada

- Regular o trânsito intestinal em caso de fezes duras ou moles.
- Ajuda a evacuar as bolas de pelo.



Conveniente

- Pó fácil de medir.
- Produto fácil de dar.



Efeito rápido

- Benefício clínico rápido e visível.
- Sem necessidade de alterar a dieta atual do animal.

Fiberact®

Apoia o trânsito intestinal



Psyllium
loiro



PluriVet®
Veterinária e Pecuária, Lda.

Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda.
E.N. 114-2, Km 8, Porta A
Vale Moinhos 2005-102 Almoester

www.plurivet.pt